

CAMPAÑA DE GRIPE TEMPORADA 23-24

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

- Vacunarse de la gripe reduce la mortalidad y morbilidad asociada a esta enfermedad.
- Se debe proteger fundamentalmente a los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave y complicaciones por razón de edad u otras condiciones de riesgo y a las que pueden transmitir la enfermedad a las personas más vulnerables.

¡PORQUE MERECE LA PENA VACUNARSE!

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Instituto de Salud Carlos III

MAYORES DE 64 AÑOS



La vacunación de la gripe en **mayores de 64 años** ha evitado el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y el 37% de las muertes atribuibles a la gripe.



Vacunar a las **madres** previene gripe grave en niños, con un 61% de efectividad frente a hospitalizaciones en menores de 6 meses.

¿QUIÉN SE DEBE VACUNAR FRENTE A LA GRIPE ?



INCICIO DE CAMPAÑA Y CALENDARIO


16 de octubre 2023	Personas de 65 y más años
	Personal sanitario y sociosanitario
31 de octubre 2023	Resto de población con indicación de vacunación

VACUNA DE GRIPE EN POBLACIÓN INFANTIL

- La incidencia de la gripe en los niños es hasta 3 o 4 veces más que en los adultos.
- Los niños/as son los principales transmisores de la gripe, ya que liberan más virus y durante más tiempo que los adultos, propagándola entre los de su edad así como a las personas mayores y adultos de su entorno.
- 2 de cada 3 niños/as que se hospitalizan por gripe son en general sanos y sin factores de riesgo.

La única forma de evitar la gripe es la vacunación

Organismos internacionales: OMS, ECDC y otros países de nuestro entorno recomiendan la vacunación infantil.



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE OTOÑO FRENTE A COVID-19

El día 16 se inicia la campaña de vacunación frente a COVID-19 administrando una dosis de recuerdo con vacunas adaptadas a las nuevas variantes del virus.

Te puedes **vacunar frente a COVID-19 junto a la gripe** si perteneces a alguno de los grupos de riesgo que son comunes a los de la gripe.

Para recibir esta dosis de recuerdo tienen que haber pasado al menos **3 meses** desde la última dosis administrada o la última infección.

Saber más:

<https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid>

<https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/gripe>

Si está interesado, escriba a

promocionprevencionmunicipios@salud.madrid.org

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA